

أولاً لازم تشوف في العريف من الصورة
في الكبار العدسات
في أنت تشاف في

① Flaccid bullae + oral affection
"Pemphigus vulgaris" مفرقة ومترشفة bulla

② Paraneoplastic Pemphigus :-
Severe mucosal affection + Bad general
Condition

③ Tense bullae + Severe pruritus
intact bulla تبقى "Bullous Pemphigoid"


④ Cicatricial Pemphigoid = 100% mucosal affection.

⑤ P.V in interglapular or intersternal area
"Pemphigus foliaceus"

ممكن بيجي صورة لـ DIF متلاق حول البثور الـ KC في صورة
لـ Desmosome مفترق في طاول الـ Pemphigus

⑥ Pemphigus vegetans = Recurrent flaccid
bullae in the flexural area → Verruca
ممكن كثر الـ friction ~~amare~~

2

1/ Subcorneal pustular dermatosis 
(Hypopyon = fluid level).

2/ E.B.A \rightarrow Bullae ruptured in hand or feet & erythema.

3/ Linear Ig. A Bullous \rightarrow "cluster of Jewels"

بسته های گویا در خط

4/ D.H \rightarrow دارو موجود در مشتاقه حساسیت
بهرش علی قول

Iodine \rightarrow Therapeutics
Dapsone \rightarrow test

D.H \rightarrow حساسیت دارو Scabies \rightarrow خارش

5/ Haily - Haily = Familial benign pemphigus.
axilla - side of neck - under breast

3

Alopecia areata:-

أو نقص الرأس كله باليركوسية موضعية، وقابلية
 ↳ *universalis*

انما لو نقص الرأس كله باليركوسية
Totale

Circumscribed area of Hair fall + Scales
 (T. Capitis) (salty ring worm)

Black dots only, area of alopecia
 T. Capitis (black dot ring worm)

discharge of pus — dirty — alopecia
 Region

diffuse dirty alopecia
 Favus

lesion is scabular — firmly adherent
 cup shaped

On a favus → always cicatricial alopecia

T. Circinata

annular lesion — active edge — healed
 centre

like a lesion with a central area of healing
 diseased — healed — centre
 Date: Page:

1

T. Cruris

active
edge

ما بين الساقين



Macerated Toe web for D.D

D.D → Interdigital Candidiasis (فطرية)
→ Interdigital T. Pedis (فطرية)
→ Gram -ve bacteria. قاذبة غالباً مستبينة
في lesions وحولها تارتنيل

Interdigital vesicular
Hyperkeratotic → T. pedis أنواع

Pitted Keratolysis → D.D to T. pedis
Caused by Corynebacterium

Onychomycosis

Lusterless - brittle nail & subungual

hyperkeratosis

Hyperkeratosis في nail و nail loss of luster في nail bed
الفقر من ياكل في nail و nail loss of luster في nail bed

Causes → Moulds → Candida
→ Dermatophytes

5

P.V.C


Hypopigmentation

Malasezia → Melanotoxins

N.B UV.B → hypopig → العلاج الوحيد

6

Candidiasis



Candida balanitis → Circumscised, or not circumscised
Candida → hypersensitivity or not



6

M.C :- poorly white - umbilicated



chicken pox \Rightarrow Polymorphic
Central Crustation.

Immune Therapy

| | | |
|----------------|--|--|
| Aldara crea | Interferon مضاد حيوي التهني بمركبات التي تسمى مضاد حيوي | P.P.D BCG Candida M.M.R non specific Immune therapy |
|----------------|--|--|

superficial bact. infection. Impetigo.
honey Comb قشرة من الحبيبات والقيح Crust


Crusted Impetigo \Rightarrow Circinate impetigo.
infant - crusty active edge.

Pediculosis قمل

Ecthyma قرحة من رجل واحد بالاحمر
قشرة من الحبيبات - بترية تحت قشرة

= Ecthyma = Ulcerative impetigo caused
by strept.

Folliculitis



Folliculitis → Boil → Carbuncle

Pseudosycosis barbae → ingrowing hair

Cellulitis

- more common
- داء من فروج
- Deep infection
- strept

Erysipelas

- dusky red
- Immunocompromised Patient or D.M.
- strept
- superficial infection
- lead to pneumonia or G.N.

Lichen Simplex Chronicus

Neck of the neck - Genitalia - upper back - Skin of legs

(8)

E.N. + Mucous membrane = STS. $\frac{6}{0}$

E.N. \Rightarrow painful. Tender nodule
better felt than seen

Causes of Blood in undulovar:

- ① Angiokeratoma
- ② Pediculosis.
- ③ Ethen simplex chronicus.

19

* Lupus vulgaris \rightarrow apple jelly nodule
 (Diagnosis test) \rightarrow partially covered

\rightarrow Erythema
 تروم على وجه

\rightarrow Purpura
 تروم على وجه

* scrofuloderma:- Sinus - I.N affection.

* T.B wart \rightarrow Fissuring عينية
 \rightarrow يتفتح

* L.L (leonine facies) + loss of outer $\frac{1}{3}$ of eye brow

* Leprosy: Thickened nerves

ulnar

in ulnar notch

الصلابة في رفق العظام
 وايضا في رفق العظام
 في رفق العظام

post auricular

الرقبة
 against resistance

Thickened nerve
 لو كان الـ nerve
 هو في رفق العظام
 ms

post tibial

10

leishmania \Rightarrow chr. ulcer in exposed area.

Psoriasis.

Grettage test \Rightarrow Auspitz sign.
(Bleeding point)

Hand \Rightarrow Sharply demarcated & Bil & symmetrical

13:1
sym \Rightarrow مقياس 13:1

Geographic Tongue

Pustular
Psoriasis

أو
لويبة

Annular Psoriasis

Acute Palmo-plantar Psoriasis

Free مقياس حرة من الكبد

Free chronic على حدة




- Acropustulosis :-

- Generalized :- if in pregnancy

↓
Impetigo herpeticum

- Erythroderma.

- Lichen Planus :- Rubbing



annular Lichen

حلقه ای لکین

[12]

D.I.D :- Linear lichen

- ~ psoriasis

- ILVEN.

- lichen striatus.

P.I.P :- Island of normal skin
✓ Follicular hyperkeratosis
- palmo plantar keratosis.
- scaly scalp

Lichen nitidus :- dorsa of hand
shiny papules male genitalia

lichen striatus. \Rightarrow hypopig نقص تصبغ

Acanthosis nigricans

PLC

discrete جُزْءٌ مُفْرَدٌ

mic scale

on removal \Rightarrow Heekly Burfa

= Parapsoriasis

[13]

D.L.E.:-

Scales in Dermatology :-

- Laminated silvery white → Psoriasis
- Mica scale → PLC.
- white branny scale → P. alba
- Cigarette paper scale → T.V.C
- Collarette scale → P. rosea
- Adherent scale → D.L.E.

D.L.E. ⇒ heal 1st by Pink Colour
Then white Colour

- Cicatricial alopecia ← عروق الاربعة

Erythematous scale & follicular plugging
Scale مترم (stippling sign)

maloc rash
SLE :- sparing nasolabial fold

⊕ Morphea :- اللوحة الارض الفص لور ابيض
عاجي
اكتر ناضجة جداً

- Linear morphea
en Coup de Sable او على شكل حفرة

- Syst. Sclerosis :-

Limited
cut

يسبب
Raynaud's phenomenon
به شوية يفرجه

Diffuse
cut

Syst. صيد ومار
بعد منه
اكبر

Telangiectasia

[15]

racked Cuticle \Rightarrow Perianquial \Rightarrow Telengetosis

Calcinosis Cutis

Lipoid protinosis \Rightarrow hoarseness of voice

- Lichen amyloidosis

Macular amyloidosis

reticulate pattern (rippling).

Scleroderma adutorum of Brocke

cedena non pitting \Rightarrow Pseudoscleroderma
مستحسنة الـ

Coloidal iron
Alcian blue
Toluidine blue
P.A.S test

حساسة
ع
ع
م
م
م

[16]

Pretibial myxoidema.

myxoid cyst = localized cat myxoidosis

Termined as myxoid
Aulages

Tubercous Xanthoma.

Xanthoma

- Eruptive \Rightarrow TGs & etc
- Palmaris \rightarrow TG & ch etc

Tubercous
Tender
Xanthelasma } \rightarrow cholesterol cyst

[17]

Basal cell carcinoma \Rightarrow Basal cell
epithelioma

rodent \rightarrow دے سنڈ ال لال
لال

لال • لال حفرہ ہاٹا لال مع تھیل نال ہاٹا



Firm \rightarrow epidermal cyst
of steato

Hard \rightarrow calcinosis cutis

Dermoid cyst \Rightarrow Line of cleavage.

Cut. horn \Rightarrow mean underlying disease

[18]

Ulcer on lower lip \rightarrow S.C.C

Base is indurated

Bowen disease

superficial spreading S.C.C

D.D \rightarrow S.C.C

Kerato-acanthoma

Tricho epithelioma

حبيب نا، في الجلد على خط الحواجب

Hydrocystoma = apocrine cyst

Syringoma = Tad pole

[19]

Hemangioma → Capillary لَوَّكَاة
 → Arteriovenous سَوَّكَاة
 dusky red

P.W.S (Nevus flamus)

Pyogenic granuloma. ⇒

حَبُّ نَارِيَّةٍ عَلَى الْفَرْجِ أَوْ فِي الْمِرْوِ

Angio Keratoma.

- Nevus arimicus ⇒ دِيَسْجِي

- Nevus flamus
 - Salmon patch
 - Nevus arimicus } 3 malformations

20

Spindle cell
angioleiomyoma } Dilatation of st. vs
lymphangoma }

P. G

cut. vas hyperpl

Glomus tumor → Benign tumor
paroxysmal pain

لحمية زردية - حكة شديدة - شرجية بالليل

Kaposi's → malignant vascular T

Lymphangioma → skin colored →

hemangio lymphangioma → skin colored

21

acquired melanolytic \rightarrow \rightarrow
nerve

Congenital melanolytic \rightarrow \rightarrow
nerve

Cafe au lait
patch

\rightarrow \rightarrow

\rightarrow
Spilus nevus

normal
skin

\rightarrow \rightarrow

Giant C.M.N.

Freckles - Senile lentigo
 \rightarrow \rightarrow

[22]

superficial spreading melanoma

- Malignant melanoma
A B C D


M.F.:

- severe pruritic
- plaque
- areas of normal skin.
- D.D wings

RXL → f →
 (and only x 100)

23

IC Thyosis:-



popital cub

no and last

mosto Cytosis
 Distiller
 2-3 days no
 mosto Cytosis

no and last

* PX Elastic in the side of the neck

- P.P.K

extending Keratosis palmaris
(Anna Hest)

G.A - قبة صبيحة - قبة صبيحة
annular lesion.
polycyclic

Lupus ~~vulgaris~~
palmaris
لحم بنفوس جبر
nose

papular sarcoidosis face
قبة صبيحة

nodular sarcoidosis
قبة صبيحة
الحنا صبر و لورام

actinic rhomboidalis nuque
D.D: Lichen simplex Chronicus (دسنيبة لبقلاوة)

(25)

L.S. E. Atrophicans برتقالي من ج. البرتقالي
ورمال الكبريت

→ NB Epithelial
Polyploidy تضاعف في عدد الكروموسومات
مثل necrosis

Erythema annular centrifugum
دوارية متبقاة

Epidermodysplasia verruciformis
نبتة حبيزة في ورم خبيث خالص

vasculitis

التهاب الأوعية

- = leucocytoclastic
- = Necrotizing vessel ^{area of necrosis}
- = cut. vasculitis
- = Hypersensitivity vasculitis

lymphocytic vasculitis

Purpura
Pigmentosa
chronic

→ 5 أسابيع

Pityriasis
lichenoid

plata PLC

infection

T.B - leprosy - leishmania

Fungal & antifungal
Viral & antiviral

Bacterial ^{علاج}

antiviral ^{في 6 أشهر و H. 2}

R.F ^{في 6 أشهر}
acyclovir 200mg 3 times / week

أو غيره

عوامل در دسترس اولاد

[27]

child born in 1st trimester pregnant

Incompatible of life

2nd → Congenital anomalies

3rd ⇒ 1st trimester

2nd trimester anti-viral vaccination is also

Kaposi variciform

eruption

old

at H.S

lesion


photosensitivity

allergy

irritant

photo
aggravating
lesion

- ① Infecti
- ② Metabolic
- ③ GT



④ Biologics

⑤

Report of S

كل أسبوعين أنزل ١٠ مجم

عكس من الصباح أو

divided dose

MTX:

15 - 25 mg/week ^{oral} ~~single~~ single

xolair

29

Short ^{12 hrs} → Hydrocorti
 Intermediate → Prednisone
 36 hrs upto 2 weeks → Prednisolone
 Methyl prednisone (Solypred)
 Triamcinolone acetonide
 most safe

long acting → Betameth
 upto 4 weeks Dexamethasone

Short acting →

P.V

60-80 mg → Prednisone

methyl prednisolone → Solypred

بیتا فونڈ ۱۰۰ تا ۱۲۰ ملی گرام ۳ بار ۱۰۰ بعد ہوا
 ۵۰۰۰۰

لو دھل flare ہوا بعض لمبرجہ لیں انتی مکر دلوئی
 ۷